

GRYPA WYWOŁANA PRZEZ WIRUS A(H1N1)

Ogólne informacje dla dyrektorów, nauczycieli,
rodziców/opiekunów i uczniów

Na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego
i Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii

Grypa wywołana przez wirus typu A (H1N1)

2

- Grypa świń jest zakaźną chorobą układu oddechowego świń wywołaną przez wirus grypy typu A.
- Wirus grypy świń typu A/H1N1 został wyizolowany po raz pierwszy u świń w 1930 roku.
- Do tej pory dochodziło do sporadycznych przypadków zakażeń na skutek bezpośredniego kontaktu z chorymi zwierzętami. W chwili obecnej stwierdzono udokumentowane przypadki przeniesienia grypy świń z człowieka na człowieka.

Grypa wywołana przez wirus typu A (H1N1)

3

- 11 czerwca 2009 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła najwyższy szósty stopień zagrożenia oznaczający pandemię (*pandemia – epidemia danej choroby zakaźnej występująca w tym samym czasie w różnych krajach i na różnych kontynentach*)

Grypa wywołana przez wirus typu A (H1N1)

4

- Wirus A(H1N1) jest zupełnie nową odmianą powstałą z połączenia wirusów grypy świń, ptaków i ludzi. Obecnie nie ma szczepionki przeciwko nowej odmianie grypy.
- Szczepionka przeciwko sezonowej grypie nie zapewnia ochrony przed zakażeniem wirusem nowej grypy A(H1N1) dlatego tak ważne są działania zapobiegawcze, czyli takie, które zmniejszają ryzyko zachorowania.
- Szczepienia przeciwko grypie sezonowej są jednak zalecane, ponieważ zapobiegają jednoczesnemu zakażeniu organizmu wirusem grypy sezonowej i wirusem A/H1N1, co może uchronić przed powstaniem kolejnych mutacji wirusów grypy.

Grypa wywołana przez wirus typu A (H1N1)

5

- Zakażenie nową grypą, podobnie jak grypą sezonową odbywa się drogą powietrzną i kropelkową (np. kichanie)
- Do zakażenia może dojść również przez dotykane przedmiotów zanieczyszczonych śliną lub wydzieliną dróg oddechowych osoby chorej i następnie dotykane śluzówki osoby zdrowej (oczu, nosa, ust).
- Wirus A/H1N1 może żyć nawet 2 godziny na takich powierzchniach jak chusteczki, klamki, biurka, klawiatura od komputera.

Grypa wywołana przez wirus typu A (H1N1)

6

Objawy nowej grypy A(H1N1) są podobne jak grypy sezonowej:

- gorączka
- kaszel
- ból gardła
- katar z płynną wydzieliną lub zatkanym nosem
- bóle mięśniowe i stawowe
- ból głowy
- dreszcze
- mogą występować wymioty i biegunka.



Grypa wywołana przez wirus typu A (H1N1)

7

Należy pamiętać, że w szkole kontakty między uczniami są bardzo bliskie, zatem choroby szerzące się drogą kropelkową mogą przenosić się szczególnie łatwo!



Co mogą zrobić rodzice, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo szerzenia się zakażeń?



Grypa wywołana przez wirus typu A (H1N1)

9

- obserwować domowników wykazujących objawy grypopodobne, w razie konieczności zgłosić się do lekarza rodzinnego,
- zatrzymać chore dziecko w domu i skonsultować z lekarzem (rodzinnym, pediatrą),
- często myć dłonie oraz pokazać dziecku jak należy to robić,
- zasłaniać nos jednorazową chusteczką higieniczną podczas kichania i usta podczas kasłania, którą po użyciu należy wyrzucić a ręce umyć wodą z mydłem,

Grypa wywołana przez wirus typu A (H1N1)

10

- nie zabierać dziecka do ludzi, którzy są przeziębieni,
- zadbać o to by dziecko zawsze miało przy sobie chusteczkę do nosa,
- spędzać z dziećmi aktywnie czas na świeżym powietrzu,
- osoby zdrowe powinny stosować maski zakrywające nos i usta podczas opieki nad osobą chorą,
- wietrzyć pomieszczenia, w których przebywają domownicy.

Co powinien zrobić personel szkoły dla ochrony uczniów i pracowników?



Grypa wywołana przez wirus typu A (H1N1)

12

- zorganizować dla uczniów oraz dla rodziców szkolenie z zakresu zapobiegania szerzenia się zakażeń wirusem nowej grypy A(H1N1),
- obserwować dzieci i młodzież wykazującą objawy grypopodobne takie jak: *gorączka, kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze, osłabienie, w niektórych przypadkach biegunka,*
- w przypadku stwierdzenia takich objawów u ucznia w szkole należy natychmiast umieścić go w pomieszczeniu odosobnionym, poinformować rodziców lub opiekunów o zaobserwowanych objawach celem konsultacji z lekarzem rodzinnym lub pediatrą,

Grypa wywołana przez wirus typu A (H1N1)

13

- jeśli uczeń z objawami grypy ma powód wejścia do pomieszczenia z innymi ludźmi, winien zakryć nos i usta chusteczką jednorazową lub płatkami ligniny, albo założyć maseczkę ochronną,
- zadbać o ciągły dostęp do środków higienicznych w toaletach,

Grypa wywołana przez wirus typu A (H1N1)

14

- często wietrzyć pomieszczenia w których przebywają dzieci i organizować jak najwięcej pobytu uczniów na świeżym powietrzu w czasie przerw i lekcji wychowania fizycznego,
- monitorować strony internetowe Państwowej Inspekcji Sanitarnej www.pis.gov.pl oraz Państwowego Zakładu Higieny www.pzh.gov.pl celem uzyskania bieżących informacji.

Informacja dla ucznia

Grypa wywołana przez wirus typu A (H1N1)

16

- Myj często ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj przy pomocy preparatów alkoholowych!
- Podczas kaszlu i czyszczenia nosa zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową, którą po użyciu wyrzuć!
- Jeśli zapomniałeś chusteczki podczas kichania i kasłania zasłoń nos i usta rękawem powyżej łokcia, a nie dłońmi!



Grypa wywołana przez wirus typu A (H1N1)

17


- Unikaj dotykania oczu i nosa, aby nie roznosić zarazków!



- W wolnym czasie przebywaj na świeżym powietrzu!



- Często wietrz pomieszczenia, w których przebywasz!



Grypa wywołana przez wirus typu A (H1N1)

18

- Unikaj kontaktu z chorymi osobami!



- Zostań w domu jeśli czujesz się źle!



- W przypadku wystąpienia objawów grypopochodnych zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu!



Dziękuję za uwagę ! ! !